医療法人若葉会六甲病院　化学療法レジメン

| | | | |
|---|---|---|---|
| 対象疾患名 | 乳癌 | 1コースの日数 | 21日 |
| レジメン名 | EC100 | 投与コース上限 | 4コース |
| 適応分類 | 初期治療 | 催吐リスク | 高度 |

レジメン内容

| No. | 薬剤名 | 標準投与量<br>(溶解液等を含む) | 投与方法 | 投与時間<br>(投与速度) | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | アプレピタント | 初日 125mｇ<br>2,3日目 80mｇ | 内服 | | 分1 | 分1 | 分1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ファモチジン | 20mｇ | 内服 | | | 分1 | 分1 | 分1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | レバミピド | 100mｇ3錠 | 内服 | | | 分3 | 分3 | 分3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | デキサメタゾン | 4mg2錠 | 内服 | | | 分2 | 分2 | 分2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生食(メインルート) | 100mL | 点滴静注 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | パロノセトロン<br>デキサメタゾン | 0.75mg<br>9.9mg | 点滴静注 | 30分 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | エピルビシン<br>生食 | 100mg/㎡<br>50mL | 点滴静注 | 全開で | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | シクロホスファミド<br>生食 | 500mg/㎡<br>100mL | 点滴静注 | 30分 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |