医療法人若葉会六甲病院　がん化学療法レジメン

対象疾患名	大腸癌	1コースの日数	14日
レジメン名	mFOLFOX6＋ベバシズマブ	投与コース上限	なし
適応分類	進行再発	催吐リスク	中等度

レジメン内容

No.	薬剤名	標準投与量 (溶解液等を含む)	投与方法	ルート No.	投与時間 (投与速度)	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	アプレピタント	初日 125mｇ 2,3日目 80mｇ	内服			分1	分1	分1											
2	デキサメタゾン	4mg2錠	内服				分2	分2	分2										
3	生食(メインルート1)	100mL	点滴静注	1		1													
4	5%ブドウ糖(メインルート2)	100mL	点滴静注	2		1													
5	ベバシズマブ 生食	5mg/kg 100mL	点滴静注	1	初回 90分 2回目 60分 3回目～30分まで短縮可	1													
6	デキサメタゾン グラニセトロン 5%ブドウ糖	9.9mg 3mg 100mL	点滴静注	1	30分	1													
7	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	85mg/㎡ 250mL	点滴静注	2	2時間 (レボホリナートと同時投与)	1													
8	レボホリナート 5%ブドウ糖	200mg/㎡ 250mL	点滴静注	1	2時間 (オキサリプラチンと同時投与)	1													
9	フルオロウラシル 生食	400mg/㎡ 50mL	点滴静注	1	全開で	1													
10	フルオロウラシル 生食	2400mg/㎡ 規定量	点滴静注	1	48時間(シュアーフューザー)	1													